



| 20 MARCH 2024

NEWSFLASH

Karobmot en Valskodlingmot, wat is die verskil?

Vir baie lank al sien ons tydens oestyd dat daar vreet skade aan van die pekan shuks is. Hierdie vreet skade vind plaas na dop verharding maar voor shuck split en het tot gevolg dat daar ekstra swart vlekke, veroorsaak deur die mis van die larwes, op die neut se dop voorkom. Oor die afgelope seisoen het hierdie vlekke so toegeneem dat dit lei tot afgradering van die neutte omdat dit nie as indop neutte uitgevoer kan word nie en die boer dus minder vir sy lewering neutte ontvang. Volgens inligting wat ons versamel het beloop hierdie gevlekte neutte tot 10% van sekere lewerings. Die % neutte wat geraak word wissel drasties tussen kultivars en verskillende produksie gebiede.

Lees die volle artikel op die SAPPA webtuiste: <https://www.sappa.za.org/karobmot-en-vals-kodlingmot-wat-is-die-verskil/>



SAPPA Greetings

T: (021) 870 2900 | E: admin@sappa.za.org | PO Box 163, PAARL, 7620
www.sappa.za.org

Share this email:



Manage your preferences | **Opt out** using **TrueRemove®**

Got this as a forward? **Sign up** to receive our future emails.

View this email **online**.

PO Box 163
Paarl, I 7620 ZA

This email was sent to info@sappa.za.org.

Continue receiving our emails, add us to your address book.

